
DIIRECCION GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBDIRECCION GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD

SITUACIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR ALTA PATOGENICIDAD H5N8 Y H5N5 Y BAJA PATOGENICIDAD H5 EN EUROPA

(25 julio 2017)

Desde el 28 de octubre y hasta la fecha se han notificado en Europa 1.132 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves domésticas, 64 en aves cautivas y 1.549 en aves silvestres. En la gráfica siguiente se muestra la evolución de los focos confirmados semanalmente:



En el siguiente cuadro se indican los países afectados, el tipo y número de focos totales de IAAP:



País	Focos aves	Focos aves de	Focos aves
	silvestres	corral	cautivas
Alemania	737	92	15
Francia	50	486	3
Italia	7	19	0
Holanda	47	9	10
Bélgica	3	2	13
Luxemburgo	0	0	4
Reino Unido	22	13	0
Irlanda	10	0	0
Dinamarca	51	1	1
Grecia	9	6	0
España	2	10	0
Portugal	1	0	0
Austria	55	2	1
Finlandia	16	0	1
Suecia	34	4	2
República Checa	39	38	1
Hungría	63	240	5
Polonia	68	65	0
Eslovenia	44	0	0
Bulgaria	13	71	2
Lituania	5	0	0
Rumanía	93	45	2
Eslovaquia	58	9	2
Croacia	12	11	0
Macedonia	1	1	0
Serbia	20	4	0
Suiza	87	0	0
Bosnia y Herzegovina	1	1	1



Ucrania	1	3	1
Total	1.549	1.132	64

Desde el 26 de junio de 2017 no ha sido confirmado ningún foco de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP). En total, desde el 27 de octubre y hasta la fecha se han notificado 63 focos en aves domésticas y 3 en aves cautivas en Europa.

En la Imagen 1 se muestran los focos confirmados desde el 26 de junio de 2017 hasta la actualidad, en la que se destaca los focos de IAAP en aves de corral en **Italia** y **norte de Francia**, y en aves cautivas en **Bélgica**. En Italia los focos corresponde a una explotación de traspatio y a otra de ponedoras. El foco de Francia se ubica a 15 kilómetros del foco identificado el pasado 23 de junio en Tournai, Bélgica, en una explotación no comercial de aves de corral y es probable que se relacione con la compra de pollitos y palomas en un mercado de ese municipio. Bélgica ha tenido 13 focos en aves cautivas en las últimas semanas.




Imagen 1. Focos confirmados desde el 26 de junio de 2017



Ante la detección de los focos en aves domésticas fueron aplicadas las medidas previstas en la Directiva 2005/94/EC, entre ellas el sacrificio de todas las aves de la explotación y el establecimiento de las respectivas zonas de protección y de vigilancia con restricción de movimiento de aves y de sus productos.

Se han analizado los movimientos desde las zonas afectadas y no se han detectado movimientos de riesgo hacia nuestro país.

Desde el MAPAMA se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

Puede encontrarse más información sobre la bioseguridad en avicultura en la página Web del MAPAMA

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/sanidad-animal/bioseguridad-buenas-practicas/aves bioseguridad.aspx